

**ВИННИЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. Н.И. ПИРОГОВА**

**Перечень лекарственных средств для использования в ответах на задания
объективного структурированного клинического экзамена по хирургии, детской
хирургии**

- Rp.: Sol. Ketorolac 3% 1ml
D.t.d. № 10 in amp.
S.: В/м по 1 мл при болях 3 раза в день
- Rp.: Sol. Diclofenaci 2,5% 3 ml
D.t.d. №10 in amp.
S.: В/м 1 раз в день
- Rp.: Sol. Nalbuphini 1% 1 ml
D.t.d № 5 in ampullis
S.: в/м при болях до 3 раз в день.
- Rp.: Sol. Morphini hydrochloridi 1% 1 ml
D.t.d. № 10 in amp.
S.: п/ш, в/м, в/в через 6 годин
- Rp: Sol.Metronidazoli 0,5% 100 ml
D.S.: В/в капельно 3 р/д
- Rp: Meropenem 1.0 №10
S.: в/в кап. на 100 мл физраствора 3 раза в день
- Rp: Ceftriaxoni 1,0
D. t. d. №10
S.: в/в кап. на 100 мл физраствора 2 раза в день.
- Rp.: Cefepimi 1,0
D.t.d №10
S. в/в кап. на 100 мл физраствора 2 раза в день.
- Rp.: Sol.Amikacini 25% 2 ml
D.t.d № 10 in ampullis
S. вводить в/м 10-15 мг/кг в день в 2 приема.
- Rp: Laevofloxacini 5% 100 ml N10
S.: в/в кап. 1 раз в день
- Rp: Amoxicillini/Klavulanati 0.875/0.125 №10
S.: в/в кап. на 100 мл физраствора 3 раза в день.
- Rp: Sol. Hydrocortizoni 2,5% 2ml
D.t.d.№10 in amp.
S.: в/в струйно на физрастворе
- Rp.: Sol. Prednisoloni 3% 1ml
D.t.d. № 10 in amp.
S.: в/в стуйно
- Rp.:Sol. Heparini 5 ml (1 ml 5000 MO)
D.t.d. № 1
S.: в/в каждые 6 час. под контролем времени свертывания крови

- Rp: Sol. Enoxararini 3 ml
D.S. По 0,4 мл подкожно 1 р/д
- Rp.: Sol. Lidocaini hydrochloridi 2% 2ml
D.t.d. №10 in amp.
S.: местный анестетик. Системно: в/в кап. в 0,9% р-ре NaCl
- Rp.: Sol. Pantoprazoli 0,02 №5
D.S. Для в/в капельного введения на 100 мл физраствора 2 раза в день
- Rp.: Sol. Glucosae 5% 200 ml
D.S. Для в/в капельного введения
- Rp.: Sol. Natrii chloridi 0,9% 200 ml
D.S. Для в/в капельного введения
- Rp.: Sol. Adrenalini hydrochloridi 0,1% 1ml
D.t.d. № 10 in amp.
S.: В/в по 1 мл в 0, 9% р-ре NaCl
- Rp.: Sol. Noradrenalini hydrotartratis 0.2% 1 ml
D.t.d. № 10 in amp.
S.: в/в кап. в 500 мл 5% р-ра глюкозы под контролем АД
- Rp.: Sol. Dobutamini 0.5% 50ml
D.t.d. № 10 in amp.
S.: В/в кап, в 5% р-ра глюкозы 2,5 – 10 мкг/кг под контролем АД
- Rp.: Sol. Amiodaroni 5%- 3ml
D.t.d. №.10 in amp.
S.: В/в на 5% р-ре глюкозы под контролем АД
- Rp.: Sol. Natrii oxybutiratis 20% 10 ml
D.t.d. № 10 in amp.
S.: в/в от 50 до 120 мг/кг
- Rp.: Sol. Atropini sulfatis 0.1% 1 ml
D.t.d. № 10 in amp.
S.: в/в при брадикардии
- Rp.: Sol. Furosemidi 1% 2ml
D.t.d. № 10 in amp.
S.: в/в
- Rp.: Ac. tranexamici 0.5 (5 ml) in amp. №5
S.: в/в медленно 2 раза в день
- Rp.: Sol. Hydroxyethyl-Starch 500 ml
D.S.: Для в/в инфузии
- Rp.: Плазма свежезамороженная одногруппная 200ml
D.S.: Для в/в трансфузии после размораживания
- Rp.: Эритроциты одногруппные 200ml
D.S.: Для в/в трансфузии после выполнения проб на групповую и резус принадлежность, индивидуальную и биологическую совместимость