

**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
ІМ. М.І. ПИРОГОВА**

**Перелік лікарських засобів для використання у відповідях на завдання  
об'єктивного структурованого клінічного іспиту з хірургії, дитячої хірургії**

- Rp.: Sol. Ketorolac 3% 1ml  
D.t.d. № 10 in amp.  
S.: В/м по 1 мл при болях 3 рази на день
- Rp.: Sol. Diclofenaci 2,5% 3 ml  
D.t.d. №10 in amp.  
S.: В/м 1 раз на добу
- Rp.: Sol. Nalbuphini 1% 1 ml  
D.t.d № 5 in ampullis  
S.: в/м при болях до 3 разів на добу.
- Rp.: Sol. Morphini hydrochloridi 1% 1 ml  
D.t.d. № 10 in amp.  
S.: п/ш, в/м, в/в кожних 6 годин
- Rp: Sol.Metronidazoli 0,5% 100 ml  
D.S.: В/в крапельно 3 р/д
- Rp: Meropenem 1.0 №10  
S.: в/в крап. на 100 мл фізрозчину 3 рази на добу
- Rp: Ceftriaxonі 1,0  
D. t. d. №10  
S.: в/в крап. на 100 мл фізрозчину кожні 12 годин.
- Rp.: Cefepimi 1,0  
D.t.d №10  
S. в/в крап. на 100 мл фізрозчину кожні 12 годин.
- Rp.: Sol.Amikacini 25% 2 ml  
D.t.d № 10 in ampullis  
S. вводити в/м із розрахунку 10-15 мг/кг на добу в 2 прийома.
- Rp: Laevofloxacini 5% 100 ml N10  
S.: в/в крап. 1 раз на добу
- Rp: Амохусіліні/Клавуланати 0.875/0.125 №10  
S.: в/в крап. на 100 мл фізрозчину кожних 8 годин.
- Rp: Sol. Hydrocortizoni 2,5% 2ml  
D.t.d.№10 in amp.  
S.: в/в струменево на фізрозчині
- Rp.: Sol. Prednisoloni 3% 1ml  
D.t.d. № 10 in amp.  
S.: в/в стуминно
- Rp.:Sol. Heparini 5 ml (1 ml 5000 МО)  
D.t.d. № 1  
S.: в/в кожних 6 год. під контролем часу згортання крові

- Rp: Sol. Enoxararini 3 ml  
D.S. По 0,4 мл підшкірно 1 р/д
- Rp.: Sol. Lidocaini hydrochloridi 2% 2ml  
D.t.d. №10 in amp.  
S.: місцевий анестетик. Системно: в/в крап. в 0,9% р-ні NaCl
- Rp.: Sol. Pantoprazoli 0,02 №5  
D.S. Для в/в крапельного введення на 100 мл фізрозчину двічі на добу
- Rp.: Sol. Glucosae 5% 200 ml  
D.S. Для в/в крапельного введення,
- Rp.: Sol. Natrii chloridi 0,9% 200 ml  
D.S. Для в/в крапельного введення
- Rp.: Sol. Adrenalini hydrochloridi 0,1% 1ml  
D.t.d. № 10 in amp.  
S.: В/в по 1 мл в 0, 9% р-ні NaCl
- Rp.: Sol. Noradrenalini hydrotartratis 0.2% 1 ml  
D.t.d. № 10 in amp.  
S.: в/в крап. в 500 мл 5% р-ну глюкози під контролем АТ
- Rp.: Sol. Dobutamini 0.5% 50ml  
D.t.d. № 10 in amp.  
S.: В/в крап, в 5% р-ні глюкози зі швидкістю 2,5 - 10мкг/кг під контролем АТ
- Rp.: Sol. Amiodaroni 5%- 3ml  
D.t.d. №.10 in amp.  
S.: В/в на 5% р-ні глюкози під контролем АТ
- Rp.: Sol. Natrii oxybutiratis 20% 10 ml  
D.t.d. № 10 in amp.  
S.: в/в від 50 до 120 мг/кг
- Rp.: Sol. Atropini sulfatis 0.1% 1 ml  
D.t.d. № 10 in amp.  
S.: в/в при брадикардії
- Rp.: Sol. Furosemidi 1% 2ml  
D.t.d. № 10 in amp.  
S.: в/в
- Rp.: Ac. tranexamici 0.5 (5 ml) in amp. №5  
S.: в/в повільно 2 рази на добу
- Rp.: Sol. Hydroxyethyl-Starch 500 ml  
D.S.: Для в/в інфузії
- Rp.: Плазма свіжозаморожена одноступінчаста 200ml  
D.S.: Для в/в трансфузії після розморожування
- Rp.: Еритроцити маса одноступінчаста 200ml  
D.S.: Для в/в трансфузії після виконання проб на групову і резус приналежність, індивідуальну та біологічну сумісність