

№ п/п	Назва препарату	Форма випуску	Шлях введення	Доза для дітей та тривалість лікування	Група препаратів
1.	Adrenalini hydrochlorydi АДРЕНАЛІНУ ГІДРОХЛОРИД	Амп. 0,1%- 1мл	в/в, є/трахеально	0,1 мл/кг 3 рази через 5 хв	Стимулятор α- і β-адренорецепторів
2.	Azithromycinum АЗІТРОМІЦИН <i>Сумамед</i>	Табл. 250, 500 мг. сироп 100мг в 5 мл, 200мг в 5 мл.	Per os	10 мг/кг/добу 1 раз на добу	Макролід
3.	Актиферин	Краплі оральні, 1 мл = 9,48 мг Fe ²	Per.os	до 1 року – 10-15 крапель 3 рази на добу 1 до 2 років – 15-25 крапель 3 рази на добу. 2 до 6 років – 25-35 крапель 3 рази на добу.	Препарат заліза
4.	Амброксол	Амп. 15 мг/мл Сироп – 30мг/5 мл Таб. 0,03 г	Per.os	10 мг/кг/добу 4 рази до 2 лет - по 2,5 мл 2 р/д от 2 до 5 лет - по 2,5 мл 3 р/д старше 5 лет - по 5 мл 2-3 р/д	Муколітичний засіб
5.	Amiodaroni АМІОДАРОН (кордарон)	Амп. 5% - 3 мл. Таб. 200 мг	в/в, per os	5 мг/кг/добу, за 2 введення	Блокатори калієвих каналів
6.	Amoxicillin АМОКСИЦИЛІН <i>флемоксин, грамокс</i>	Табл. 500 мг.	Per.os	50 мг/кг/добу 2-3 р. на добу	Напівсинтетичний пеніцилін
7.	Ампіцилін	Фл 0,5 г	В/в, в/м	50-100 мг/кг/день 4 рази	Пеніциліни широкого спектра дії
8.	Атоксил (кремнію діоксид)	Фл. 10,0 Саше 2,0	Per.os	1-7 років – 150-200 мг/кг/добу в 3-4 прийоми старше 7 років – 12 г/добу	Ентеросорбенти
9.	Aciclovirum АЦИКЛОВІР (зовіракс, віролекс, гевіран) <i>Противірусний препарат</i>	Фл. порошок по 200 мг. Таб. 200. 400 мг.	в/в per.os	по 10 мг/кг/разово 3 рази на добу	Противірусний препарат
10. 3	Будесонід	Аероз. 200 мкг/доза 50 мкг/доза	інгал.	від 2 до 7 років: 200-400 мкг щоденно від 7 років: 200-800 мкг щоденно	Інгаляційний глюкокортикоїд

11.	Беродуал (іпратропію бромід, фенотеролу гідробромід;)	р-р д/инг. фл. 20 мл, р-р д/инг. фл. 40 мл,		до 6 лет - 0,1 мл/кг 6–12 лет. - 0,5–2,0 мл старше 12 лет - 1,0–2,5 мл	Адренергічні засоби в комбінації з антихолінергічними засобами
12.	Vancomicini ВАНКОМІЦИН		в/в	15 мг/кг/добу за 1-2-3 рази	Антибіотик,стафілококовий сепсис
13.	Гентаміцин	Амп. 0,04 г	в/в, в/м	старше 1 року – 2-3 мг/кг/добу 3 рази Максимальна добова доза для дітей – 5 мг/кг	Аміноглікозиди
14.	Діпірідамол	таб. 25 мг амп. 5 мг/мл	в/м, per os	від 12 років по 1-2 мл 0,5 % розчину	Антитромботичні засоби. Антиагреганти
15.	Dexamethasonum ДЕКСАМЕТАЗОН	0,4 % - 1 мл (4 мг)	в\в в\м	Разова доза 0,15-0,3-0,6-1,0 мг/кг	гормон, глюкокортикостероїд
16.	Домперидон	таб 10 мг сусп. 1мг/мл	per os	старше 12 років – 10 мг до 3 раз/добу до 12 років – 0,25 мг/кг	Пропульсанти
17.	Дротаверин	амп. 20 мг/мл таб. 40 мг, 20 мг	per os в\в в\м	6–12 лет: 1 таблетка 1-2 р (макс 80 мг) старше 12 р.: 1 таб 1-4 р/день (макс 120мг)	Спазмолітик
18.	Diclophenaci natrii ДИКЛОФЕНАК НАТРІЮ	Амп. 2,5% - 3 мл. Т. 25, 50 мг	в/м, per os	3 мг/кг/добу	Нестероїдний протизапальний препарат
19.	Dopamine ДОПАМІН	Амп.	в/в	Ниркова доза 2-4 мкг/кг/хв. 1 раз/добу Серцева доза 4-10 мкг/кг/добу	Шок, серцева недостатність
20. 4	Enterol 250 ЕНТЕРОЛ 250	пакетик	Per.os	Н/н: 1 пак.на день, до 6 років: 1 пак. 1-2 р/д, >6 років по 1-2 пак. 1-2 р/д.	Антидіарейний препарат
21.	Еналаприл	таб. 5; 10; 20 мг	Per.os	від 6 років – від 20 до 50 кг – 2,5 мг ≥ 50 кг – 5 мг	Інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту
22.	Ibuprofenum ІБУПРОФЕН (нурофен, ібуфен,бофен)	Таб. 0,2; сусп. «нурофен» 100 мг/5мл фл.100мл.	Per. os	При підвищенні температури тіла 10 мг/кг разова доза. При необхідності до 3-х разів на добу	жарознижуючий
23.	Етамзила натрію	Амп. 125 мг/мл таб. 250 мг	per os в\в в\м	5- 10 мг/кг маси тіла	Гемостатичні засоби для системного застосування. Ангіопротектор
24.	Канавіт	Амп. 10 мг/мл	в/м	Новонароджені - не більше 1 мг До 1 року - 1- 2,5 мг 1-6 років - 2,5-5 мг 6-15 років - 5-10 мг	вітамін К1

25.	АТФ	Амп. 10 мг/мл	В/в стр.	0,1-0,2-0,3 мг/кг	Антиаритмічний засіб
26.	7 Карбоцистеїн	Сироп 100мг/5 мл	per os	від 2 до 5 років: по 200 мг на добу за 2 прийоми, від 5 до 15 років: 300 мг на добу за 3 прийоми	Муколітики.
27.	Креон	капс. 10; 25; 40 тис. Од	per os	1 тис. Од/кг	Поліферментні препарати
28.	Лоратадин	таб. 0,01 г сироп 5мг/5 мл	per os	від 2 до 12 років: більше 30 кг: 10 мг 1р/д менше 30 кг – 5 мг сиропу 1 р/д	Антигістамінні засоби
29.	Magnesium sulfurici МАГНІЮ СУЛЬФАТ	Амп. 25%- 10 мл	в/в, в/м	0,2 мл/кг	Протинабряковий
30.	Метоклопрамід	Амп. 5 мг/мл	в/в, в/м	Разова доза: 1-3 роки: 1 мг 3-5 років: 2 мг 5-9 років: 2,5 мг 9-18 років: 5 мг 15-18 років: 10 мг	Стимулятори перистальтики
31.	Монтелукаст	таб. 4; 5 мг	Per.os	від 2 до 5 років. 4 мг/добу від 6 до 14 років.5 мг/добу від 15 років 10 мг/добу	Антагоністи лейкотрієнових рецепторів
32.	Омепразол	капс. 20 мг		від 1 року 10-20 кг - 10 мг* 1 раз на добу. понад 20 кг - 20 мг 1 раз на добу	Інгібітори протонної помпи.
33.	Nifuroxazidum НІФУРОКСАЗИД	Сусп. 90 мл. (220 мг/5 мл); Табл. 100 мг	Per.os	2-6 міс. 2,5×2 р/д; 6 міс. - 6 р. по 5мл х 3р/д.; ↑ 6 років по 5 мл х 4р/д. до 6 років 1 т. × 4р/д ↑ 6 років по 2 т.× 4р/д.	Кишковий антисептик, похідний нітрофурану
34.	Osetamivir phosphate ОЗЕЛЬТАМІВІР (ТАМІФЛЮ)	Капс. 0,075 (75 мг) Сусп. 5 мл. – 60 мг.	Per. os	Дітям від 1 до 13 р. сусп. по 2 мг/кг × 2 р. на добу - 5 днів; > 13 р. по 75 мг (1 капс.) × 2 р. на добу – 5 днів.	противірусний препарат, інгібітор нейрамінідази грипу А,В
35.	Natrium oxybutyricum ОКСИБУТИРАТ НАТРІЮ	Амп. 5 мл, 10 мл – 20 %	в/м, в/в	Разова доза 50 - 100 мг/кг (1мл = 200 мг)	неінгаляційний наркотичний засіб
36.	Paracetamolum ПАРАЦЕТАМОЛ (ефералган,панадол,цефекон,піарон)	Сироп 120 мг/5мл Таб. 0,2; 0,325; 0,5 Свічки 0,08; 0,117; 0,33	Per. os, per rectum	10-15 мг/кг разова доза – до 4 разів на добу	Жарознижуючий
37.	Prednisolonum ПРЕДНІЗОЛОН	Амп. 3 % - 1 мл (30 мг) Таб. 5 мг	Per. os; в\в; в\м	Разова доза 2 – 3 – 5 – 10 – 15 мг/кг	гормони, глюкокортикостероїди

38.	Propranolol ПРОПРАНОЛОЛ (анаприлін, обзидан)	Таб. 10, 40 мг. Амп.	Per os	0,5 – 1 мг/кг/добу за 2 прийоми	Бета-адреноблокатор
39.	Sibazonum, Diazepamum СІБАЗОН	Амп. 0,5% - 2 мл (10 мг)	в\в в\м	Разова доза 0,1 мл/кг (0,5 мг/кг)	седативний, протисудомний препарат
40.	Сінекод	Краплі 5 мг/мл Сироп, 1,5 мг/мл	Per.os	Сироп: від 3 до 6 років: по 5 мл 3 р/д; від 6 до 12 років: по 10 мл 3 р/д; від 12 до 18 років: по 15 мл 3 р/д. Краплі: від 2 місяців до 1 року – по 10 крапель 4 рази на добу; дітям від 1 до 3 років – по 15 крапель 4 рази на добу; дітям від 3 років – по 25 крапель 4 рази на добу.	Засоби, що застосовуються при кашлі
41.	Сальбутамол	Аероз. 100 мкг/доза таб. 2; 4 мг; р-н для інг. 1 мл - 1,25 мг порошок для ингаляцій - 1 доза - 0,2 или 0,4 мг	інгал.	Аерозоль: від 4 до 12 років – 100-200 мкг/разово	Агоніст бета-2- адренорецепторів.
42.	Фамотидин	таб 20 мг	Per.os	Дітям від 3 років 2 мг/кг/сут В 2 прийома, не більше 40 мг/добу	Антагоністи H ₂ - гістамінових рецепторів
43.	Холекальциферол	1 кр. – 500 Од	Per.os	Профілактика рахіту – 500 Од/день Лікувальна доза: 2000- 5000 Од/день	Препарати вітаміну D
44.	Fluconasolum ФЛУКОНАЗОЛ (фуцис)	табл.50мг,15 0мг 50мг фуцис ДТ	Per.os	3мг/кг/добу 1 раз на добу	протигрибковий препарат
45.	Фуросемід	Амп. 10 мг/мл Таб 40 мг	Per.os в\м в\в	1 мг/кг, не більше 20 мг	діуретики
46.	фосфалюгель (алюмінію фосфату)	саше	Per.os	віком до 6 місяців: 1/4 пакета або 1 чайна ложка після кожного з 6 годувань; після 6 місяців: 1/2 пакета або 2 чайні ложки після кожного з 4	Антациди

				годувань.	
47.	Фурамаг	капс. 25 мг	Per.os	від 3-х років до 10 років (з масою тіла до 30 кг) призначати до 5 мг/кг /добу від 10-ти років (з масою тіла від 30 кг) – по 50 мг 3 рази на добу.	Похідні нітрофурану.
48.	Супрастин	таб 25 мг амп. 20 мг/мл	Per.os в/м в/в	діти віком від 1 до 12 місяців: 6,25 мг (1/4табл.), 2-3 рази на добу; - діти віком від 1 до 6 років: 8,3 мг (1/3 табл.),2-3 рази на добу; - діти віком від 7 до 14 років: 12,5 мг (1/2 табл.),2-3 рази на добу. Добова доза не повинна перевищувати 2 мг/кг маси тіла.	антигістамінні засоби 1 покоління
49.	Cefixime ЦЕФІКС	Сусп. 100мг/5 мл. (60 мл) 50мг/5 мл. (30 мл)	Per. os	8 мг/кг на добу, 1 або 2 рази на добу	цефалоспорин 3 покоління
50.	Ceftriaxon ЦЕФТРИАКСОН	Фл.0,5 і 1,0 Г	в/в в/м	100 мг/кг/добу кожні 8 - 12 годин	цефалоспорин 3 покоління