

Міністерство охорони здоров'я України
Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова
Напрямок -1201 «Медицина»
Спеціальність – 7.12010002 «Педіатрія»
Спеціальність – 7.12010004 «Медична психологія»

Станція № 4 «Виписка рецептів»

Перелік основних фармакологічних препаратів до державного практично-орієнтованого іспиту з внутрішньої медицини, професійних та інфекційних хвороб:

№	Українська назва	Назва латиною	Форма випуску, шлях введення	Основні побічні ефекти групи препаратів
Кардіологія				
1	Нітрогліцерин	Nitroglycerinum	таб. 0,0005 г	
2	Дигоксин	Digoxinum	амп. 0,25% мг/мл по 1мл таб. 0,25 мг	
3	Морфіна гідрохлорид	Morphini hydrochloridi	амп. 1% р-н 1 мл в/в болюсно	
4	Гепарин	Heparinum	фл. 5000 МО/мл 5 мл (1 мл 4 рази/доб п/шк. в нефрології.	
5	Еноксапарин	Enoxaparinum	шприц 0,4 мл п/шк двічі на добу протягом 3-х тижнів в нефрології	Носові та шлунково-кишкові кровотечі, гематоми, гематурія, підвищення рівня печінкових ферментів, тромбоцитопенія
6	Альтеплаза	Alteplasa	фл. 20, 50 мг в/в	
7	Ізосорбїду динітрат (ізокет)	Izosorbidi dinitratum	амп. 0,1% - 10 мл в/в крапельно	

8	Адреналін	Adrenalini hydrochloridum	амп. 0,1% 1 мл в/в	
9	Клофелін	Clophelinum	таб. 0,075 мг	
10	Раміприл	Ramipril	таб. 0,01г всередину 1 раз на добу вранці тривало	Гіперкаліємія, гіпотензія, сухий кашель, бронхоспазм, шкірний висип, ангіоневротичний набряк.
11	Периндоприл	Perindoprilum	таб. 0,004 г всередину 1 раз на добу вранці тривало	Гіперкаліємія, гіпотензія, сухий кашель, бронхоспазм, шкірний висип, ангіоневротичний набряк.
12	Лізіноприл	Lisinoprilum	таб. 0,01г всередину 1 раз на добу вранці тривало	Гіперкаліємія, гіпотензія, сухий кашель, бронхоспазм, шкірний висип, ангіоневротичний набряк.
13	Карведилол	Carvedilol	таб. 0,0625 г 2 рази на добу.	Брадикардія, порушення серцевої провідності, бронхоспазм, нудота
14	Бісопролол	Bisoprololum	таб. 0,005 г 1 раз на добу вранці перед їжею тривало	Брадикардія, порушення серцевої провідності, бронхоспазм, нудота
15	Індапамід	Indapamidum	таб. 0,0025 мг всередину по 1 таблетці 1 раз на добу вранці тривало.	Гіпокаліємія, гіпонатріємія, гіпохлоремія, метаболічний алкалоз, гіпотензія, парестезії, слабкість у м'язах.
16	Гідрохлортіазид	Hydrochlorthiazidum	таб. 25 мг, 50 мг, 100	
17	Вальсартан	Valsartanum	таб. 0,16 г 1 раз на добу вранці тривало	
18	Амлодипін	Amlodipinum	таб. 0,005 1 раз на добу ввечері тривало	Головний біль, тахікардія, набряки, проноси, відчуття

				жару в обличчі
19	Верапаміл	Verapamilum	таб. 0,04 г 2 рази на добу	
20	Ізосорбїду мононітрат	Izosorbidi mononitratum	таб.0,02 всередину по 1 таб. 2 рази в день	Головний біль, артеріальна гіпотензія, тахікардія, запаморочення, сонливість, гіперемія шкірних покривів, нудота, блювання, шкірний висип
21	Аміодарон	Amyodaronum	амп. 5% р-н 3 мл в\в (електрокардіоверсія – 5 мг\кг); таб. 200 мг	
22	Пропафенон	Propafenone	таб. 150 мг, 300 мг (електрокардіоверсія – 450-600 мг), амп. 10мл (35 мг), 20 мл (70 мг) р-н 2 мг\кг в\в протягом 10 хв	
23	Фуросемід	Furosemide	таб. 0,04 мг вранці щоденно;	Гіпокаліємія, гіпокальціємія, гіповолемія, дегідратація і схильність до тромбоутворення, гіпотензія.
24	Торасемід	Torasemide	таб. 0,01 г вранці щоденно;	Гіпокаліємія, гіпокальціємія, гіповолемія, дегідратація і схильність до тромбоутворення, гіпотензія.

25	Спіронолактон (верошпірон)	Spirolactonum	таб. 25 мг	
26	Ацетилсаліцилова кислота	Acidum acetylsalicylicum	таб. 0,075 г, 4 таблетки сублінгвально одноразово, потім 1 таблетка на ніч після їжі тривало	Ульцерогений ефект, кровотечі з ШКТ, свербіж, набряк шкіри, бронхоспазм; біль в епігастрії, діарея, печія, тромбоцитопенія, агранулоцитоз; біль в шлунку, диспепсія, свербіж, набряк шкіри, бронхоспазм, гематоми
27	Клопідогрель	Clopidogrelum	таб. 0,075 г, 4 таблетки сублінгвально одноразово, потім 1 таблетка на ніч після їжі тривало	Ульцерогений ефект, кровотечі з ШКТ, свербіж, набряк шкіри біль в епігастрії, діарея, печія, тромбоцитопенія, агранулоцитоз; біль в шлунку, диспепсія, свербіж, набряк шкіри, бронхоспазм, гематоми
28	Аторвастатин	Atorvastatin	таб. 10 мг, 20 мг всередину	
29	Ривароксабан (Ксарелто)	Rivaroxaban	таб. 10 мг, 15 мг, 20 мг всередину	
30	Варфарин	Warfarinum	таб. 2,5 мг, 5 мг всередину	
31	Атропін	Atropini sulfatis	п/ш, в/в, в/м 1 мл 0,1 % р- ну	Кропів'янка, ангіоневротичний набряк, анафілактичні реакції.
		Пульмонологія		
1	Амоксицилін	Amoxicillinum	таб. 1,0 двічі на добу протягом 10 днів	Кандидоз шкіри та слизових, еозинофілія, анафілактичний шок, діарея, нудота.
2	Амоксицилін /	Amoxicillinum\acidi	таб. 1 г (0,875 /0,125 г) по 1	Кандидоз шкіри та слизових,

	клавуланова кислота	clavulanici	таб. 2 рази на день протягом 5 днів; фл. 1,0/0,2 Вміст флакону розчинити в 100 мл фізіологічного розчину, вводити внутрішньовенно крапельно тричі на добу, після внутрішньошкірної проби на переносимість, протягом 7 діб	еозинофілія, анафілактичний шок, діарея, нудота.
3	Цефтріаксон	Ceftriaxonum	фл. 1,0 г в/в Розвести 2 г на 20 мл фіз.розчину, вводити повільно 1 раз на добу	Еозинофілія, лейкопенія, тромбоцитопенія, діарея, висип та підвищення рівня печінкових ферментів
4	Азитроміцин	Azithromycinum	таб. 0,5 г 1 раз на день через 30 хвилин після їжі протягом 3-х діб.	
5	Меропенем	Meropenem	фл. 0,5 г, 1,0 г в\в	
6	Левофлоксацин	Levofloxacinum	таб. 250 мг, 500 мг всередину	
7	Моксифлоксацин	Moxifloxacinum	таб. 0,4 г всередину; фл. 250 мл (1,6 мг\мл) в\в	
8	Амікацину сульфат	Amykacini sulphatis	фл. По 0,5 г, 1,0 г 15 мг\кг	
9	Ванкоміцин	Vancomycin	фл. 0,5 г, 1,0 г в\в 30 мг\кг	
10	Лінезолід	Linezolidi	таб. 600 мг всередину; фл. 0,2 %-300 мл (2 мг\мл) в\в	
11	Сальбутамол	Salbutamol	аероз. 200 доз, 400 доз (1 доза=0,1 мг сальбутамола);	Тремор, головний біль, тахікардія, підвищення АТ.

		Aer. «Salbutamol» 15 ml	небули 2,5 мг\2,5 мл, 5 мг\мл, через небулайзер протягом 10 хв. 4 рази на добу	
12	Фенотерол/іпратропію бромід (беродуал)	Fenoterolum\ Ipratropium bromide	аероз. 0,05 мг\0,021 мг (200 доз) інгаляційно; фл. По 20 мл (1 мл=0,5 мг\0,261 мг) інгаляційно	
13	Салметерол/флютиказон (серетид)	Salmeterolum/ Fluticasone	аероз. для інгаляцій 0,000025/0,000125 г/доза (120 доз) Вдихати по дві дози 2 рази на добу	
14	Будесонід/формотерол (симбікорт)	Formoterolum/ Budesonidum	0,0000045/0,00016 г/доза, (60 доз) порошок для інгаляцій Вдихати по 1 вдоху двічі на добу	
15	Монтелукаст	Montelukastum	таб. 10 мг всередину	Головний біль, абдомінальний біль, діарея, анафілаксія, психічні розлади
		Ревматологія		
1	Метотрексат	Methotrexatum	таб. 0,0025 г всередину 1 раз на тиждень (кожного понеділка по 2 таб (5 мг) вранці та ввечері) до їжі тривало	Лейкопенія, анемія, тромбоцитопенія, порушення оогенеза, сперматогенеза, виразковий стоматит, анорексія, нудота.
2	Преднізолон	Prednisolonum	таб. 0,005 г всередину по 5 таблеток в 8.00, по 3 таблетки в 12.00 протягом 5 діб; або 2 таб. 1 раз на	Знижена опірність до інфекцій, артеріальна гіпертензія, набряки, гіперглікемія, безсоння, порушення

			день, вранці після їжі.	менструального циклу, синдром Кушинга, остеопороз, виразки слизової оболонки шлунково-кишкового тракту
3	Метилпреднізолон	Methylprednisolonum	таб. 0,004г всередину по 2 таб. 1 раз на день, вранці після їжі	Знижена опірність до інфекцій, артеріальна гіпертензія, набряки, гіперглікемія, безсоння, порушення менструального циклу, синдром Кушинга, остеопороз, виразки слизової оболонки шлунково-кишкового тракту
4	Диклофенак Na	Diclofenaci natrium	таб. 0,025 г всередину по 1 таб. 3 рази на день, після їжі.	Ульцерогенна дія, тромбоцитопенія, анафілактична реакція, бронхоспазм; НПЗП-гастропатія, затримка натрію та води, підвищення АТ, гематотоксичність, гепатотоксичність, схильність до кровотеч
5	Мелоксикам	Meloxicami	таб. 0,0075 г всередину по 1 таб 2 рази на день під час їжі.	Ульцерогенна дія, тромбоцитопенія, анафілактична реакція, бронхоспазм; НПЗП-гастропатія, затримка натрію та води, підвищення АТ, гематотоксичність, гепатотоксичність, схильність

				до кровотеч
6	Алопуринол	Allopurinolum	таб. 0,1г по 1 таб. 1 раз на день після їжі (не розжовувати, запити водою), контроль рівня сечової кислоти.	Реактивні приступи подагри, тромбоцитопенія, агранулоцитоз, аластична анемія, порушення функції печінки
7	Гідрохлорохін(плаквеніл)	Hydroxychloroquine	таб. 0,2 г всередину по 1 таб. 2 рази на день під час їжі	Нудота, блювання, анорексія, фотофобія, фотосенсибілізація, анемія, тромбоцитопенія, лейкопенія.
		Гастроентерологія		
1	Пантопразол	Rantoprazole	таб. 0,04 г всередину по 1 таб. зранку та ввечері до їжі, не розжовуючи;	Головний біль, біль у животі, запор, діарея, метеоризм, нудота/блювання
2	Омепразол	Omeprazolium	таб. 0,02 г всередину по 1 таб. зранку та ввечері до їжі, не розжовуючи	Головний біль, біль у животі, запор, діарея, метеоризм, нудота/блювання
3	Лансопразол	Lansoprasolum	таб. 0,03 г всередину по 1 таб. зранку та ввечері до їжі, не розжовуючи	Головний біль, біль у животі, запор, діарея, метеоризм, нудота/блювання
4	Рабепразол	Rabeprazolium	таб. 0,02 г всередину по 1 таб. зранку та ввечері до їжі, не розжовуючи	Головний біль, біль у животі, запор, діарея, метеоризм, нудота/блювання
5	Езомепразол	Esomeprazolium	таб. 0,04 г всередину по 1 таб. зранку та ввечері до їжі, не розжовуючи	Головний біль, біль у животі, запор, діарея, метеоризм, нудота/блювання
6	Амоксицилін	Amocillinium	таб.1,0 г всередину двічі	

			на добу	
7	Кларитроміцин	Clarithromycinum	таб. 0,5 г всередину двічі на добу	Біль у животі, діарея, нудота, блювання, спотворення смаку
8	Мебеверин	Mebeverin	капс. 0,2 г всередину по 1 капс. зранку та ввечері до їжі, не розжовуючи.	
9	Панкреатин	Pancreatinum	таб. 20 000 ОД всередину по 1-2 таб. під час їжі 3 р\д	
10	Мезим	«Mezym-forte» N. 30	Др. 20 000 ОД всередину по 1-2 таб. під час їжі 3 р\д	
11	Креон	«Kreon»	Капс. 25 000 ОД всередину по 1-2 таб. під час їжі 3 р\д	
12	Месалазин	Mesalazinum	таб. 0,4 г, 0,8 г, 1,0 г всередину по 1-2 таб. під час їжі 3 р\д	
13	Соматостатин	Somatostatinum	амп. 250 і 3000 мкг в\в (вміст флакона розчинити в розчиннику)- спочатку повільно струминно протягом 3-5 хв в «ударній» дозі 250 мкг, потім переходять на безперервну інфузію зі швидкістю 250 мкг\год.	
14	L- орнітин – L-аспартат (Орнітокс)	L-ornithine – L-aspartate	Гран. для перорального введення 5,0 всередину по одному пакетику	

			гранул, розчинених в 200 мл рідини, 2-3 рази на добу після їжі; амп. 10 мл в\в крапельно вводять до 4-х ампул\д, розчинивши в 500 мл інфузійного розчину	
		Нефрологія		
1	Пентоксифілін	Pentoxiphyllinum	таб. 0,1 г; всередину по 2 таб. 3 рази на день	
2	Дипіридамо́л	Dipyridamolium	таб. 0,025 г; всередину по 2 таб. 3 рази на добу до їжі, запивати 1 стаканом води.	
3	«Кетостерил»	«Ketosteril»	таб. по №100; всередину по 4 таб. 3 рази на день під час прийому їжі	
		Гематологія		
1	Сорбіфер	Sorbifer	таб. 0,38 г всередину, по 1 таб. 2 рази на день, не подрібнюючи, запити водою	
2	Ціанокоболамін	Суанособоламін	амп. 0,05% р-ну 1 мл в/м щодня 10 днів	Гіперкоагуляція, тахікардія, головний біль, біль в ділянці серця шкірний висип, алергічні реакції
3	Фолієва кислота	Acidum Folicum	таб. 0,005 г всередину 1 раз	

			на добу 30 днів	
4	Амінокапронова кислота	Acidum aminocarponicum	амп. 5% 100 мл Вводити в/в крапельно по 100 мл 2-3 р. на добу	Зниження апетиту, печія, блювання, діарея, сонливість, порушення кольорового зору
5	Транексамова кислота	Acidi tranexamici	5 ml (50 мг/мл) в/в крапельно	Зниження апетиту, печія, блювання, діарея, сонливість, порушення кольорового зору
		Ендокринологія		
1	Метформін	Metformin	таб. по 0,5 г, по 1 таблетці 2 р. в день під час їжі	Нудота, блювання, діарея, біль у животі, відсутність апетиту.
2	Гліклазид MR(Діабетон MR, Діаглізид MR)	Diabeton MR Diaglizid MR	таб. по 0,06 г; всередину по 1 таб. під час сніданку	
3	Глімепірид (Амарил, Діапірид)	Amaril Diapirid	таб. по 0,001 г, 0,002 г, 0,003 г, 0,004 г; всередину по 1 таб. під час сніданку	
4	Онґліза	Onglyza	таб. по 0,005, 0,0025 г; всередину по 1 таб. під час сніданку	
5	Мерказоліл (Тирозол, Метизол)	Mercazolilum	таб. по 0,005, 0,01 г, по 2 таб. 3 рази на добу	
6	L-тироксин (еутирокс)	L-Thyroxinum		
7	Дапагліфлозін	Dapagliflozini	Таб. по 0,01 по 1 табл. під час сніданку	
		Інфекційні хвороби		
1	Доксициклін	Doxycyclini	капс. 0,1 г;	

			всередину по 1 капсулі 2 рази на день	
2	Бісептол-480	Biseptol-480	таб. 480 мг; всередину по 2 таб. 2 рази на день	
3	Спіраміцин	Smiramycini	таб. по 3 млн МО; всередину по 1 таб. 3 рази на день	
4	Озельтамівір	Oseltamiviri	капс. 75 мг; всередину по 1 капс. 2 рази на добу	
5	Ацикловір	Acicloviri	таб. 0,2 г; всередину по 1 таб. 5 разів на день протягом 7 днів	Анемія, тромбоцитемія, анафілаксія, психічні розлади, задишка, нудота
6	Альбендазол	Albendazoli	таб. 0,4г всередину по 1 таб. 1 раз на день 1 день	
7	Софосбувір	Sofosbuviri	таб. 400 мг; всередину по 1 таб. 1 раз на день	
		Фтизіатрія		
1	Ізоніазид	Isoniazidi	таб. 0,3 г; всередину по 1 таб. 1 раз на день із розрахунку 5 мг на кг маси тіла протягом 2 місяців	
2	Рифампіцин	Rifampicini	капс. 0,15 г; всередину по 4 капс. 1 раз на день	Гепатотоксичність, нефротоксичність, тромбоцитопенія, диспепсичні розлади, алергічні реакції.

3	Етамбутол	Ethambutoli	таб. 0,4 г; всередину по 3 таб. 1 раз на день	
4	Піразинамід	Pirazinamidi	таб. 0,5 г; всередину із розрахунку 25 – 30 мг на кг маси тіла в 3 прийома на добу протягом 2 місяців	

**Зав. кафедри
внутрішньої медицини
медичного факультету №2**

проф. В. М. Жебель